2025年7月23日

報道機関 各位

発電する！ マアジも集まる！

浮体式洋上風力発電施設に集魚効果を発見

【概要】

長崎大学水産学部の八木光晴准教授と、大学院総合生産科学研究科修士課程の土田真平を中心とする研究グループは、長崎県五島市沖で建設中の浮体式洋上風力発電施設（写真1）に集魚効果があるかどうかを、環境DNA（eDNA）技術を用いて明らかにしました。

年間を通じて実施された調査の結果、風車周辺の海域ではマアジのDNA断片が多く検出され、同種が風車に鯖集（いしゅう）（集まっている）している可能性が示されました。これは、浮体式洋上風力発電施設が魚類の行動や分布に影響を与える可能性を示す重要な証拠の一つです。

現在、世界的にも浮体式洋上風力発電の設置例は少なく、五島市沖の風車は国内外の先駆けとして建設が進められているものです。本研究は、このような新たな海洋構造物（海のランドマーク）が周辺の魚類群集の生態に及ぼす影響を示したものであり、再生可能エネルギーの導入と海洋環境保全との調和を考える上で、極めて重要な知見を提供するものです。

なお、本研究は、公益財団法人日本生命財団「人間活動と環境保全との調和に関する研究」の助成を受けて実施されました。この研究成果は、2025年7月16日に国際学術誌 Aquatic Conservation: Marine and Fresh Water Ecosystems の早期オンライン版に掲載されました。

写真1 長崎県五島市沖の浮体式洋上風力発電施設

1. 【背景】

近年、再生可能エネルギーの主力電源化に向けて、特に浮体式洋上風力発電施設の大規模な建設が進むことが予想されています。しかし、その一方で、こうした施設が海洋生物や漁業に与える影響は、まだ十分に解明されていません。

なかでも、魚類が洋上風車の周囲に集まる「蝟集効果」の有無は、人間活動が海洋生態系に与える影響を理解する上で重要な手がかりとなります。そこで本研究では、浮体式洋上風力発電施設に魚類が集まる傾向があるかどうかを、環境 DNA 技術を用いて検証し、人間活動が海洋生態系に与える影響の一端を明らかにするため、研究を実施しました。

2. 【研究手法・成果】

本研究では、環境 DNA 技術を用いて調査を行いました。環境 DNA 技術とは、環境中の水から生物由来の DNA を検知し、生物の存在や資源量の推定を行う技術です。現地での作業は水を採るだけで良く、簡単に膨大なデータを得ることが出来ます。本研究ではこの技術を用いて、マアジの環境 DNA 濃度を計測することにより、マアジの分布傾向を推定しました。調査は 2023 年 4 月から 12 月にかけて実施し計 5 回のサンプリングを行いました。採水地点は、風車近傍区の 4 地点と、対照区の 4 か所としました (図 1)。

採水は長崎大学保有の練習船「鶴洋丸」を利用して行いました (写真 2)。採水後、研究室に水を持ち帰り、ろ過、DNA の抽出、リアルタイム PCR といった過程を経て、マアジの環境 DNA 濃度を測定しました (図 2)。

その結果、年間を通して風車近傍区ではマアジの環境 DNA 濃度が有意に高いことが分かりました (図 3)。

図 1 採水地点を示した図。●が採水地点で、風車は FH、F1、F2、F3 の位置にあります。風車近傍区 (E1、E2、E3、E4) と対照区 (E5、E6、E7、E8) は 4 マイル (約 7,400m) 離れています。

写真2 練習船「鶴洋丸」にて風車近傍区での採水中の様子。採水の際は手袋を着用し、サンプル外からマアジの DNA が混入しないように気をつけて実施しました。

図2 研究の概要図。(風車、水深及び調査船は同比率で描いている) 練習船「鶴洋丸」は全長約 43m であり、風車のブレードと同程度の長さです。また、風車の柱部分は水深約 76m まで及んでおり、それより深い部分はチェーンのみとなっています。図のように風車近傍区で採水した後、4 マイル離れた対照区で採水を実施。採水したサンプル水は、研究室に持ち帰り室内実験により環境 DNA の分析を行いました。

図3 マアジの環境 DNA 濃度を示した箱ひげ図。赤色が風車近傍区で青色が対照区の環境 DNA 濃度を示しています。縦軸は環境 DNA 濃度を対数変換し示しています。

3. 【研究者のコメント】

海は広いな大きいな。海は、私たちにとって果てしない存在のように感じられます。しかし、その広大な海も、私たち人間の活動によって深刻な影響を受けつつあります。たとえば、陸地が全く見えない外洋の海域ですら、人間の影響を免れてはいません (Yagi et al., 2022; Kobayashi et al., 2021)。そして今、私たちは海に新たな構造物——巨大な風車を設置し、風の力を利用して電力を得ようとしています。いわゆる再生可能エネルギーの一つとして、持続可能な電力供給を目指す取り組みです。

では、この巨大な人工構造物に対して、海の生きものたちはどのように反応するのでしょうか？この問いに答えるため、私たちは調査航海に乗り出しました (写真3)。風車が設置されている海域は、予想通り風が強く、波も高いため、観測作業は常に船酔いと闘いでもありました。しかし、そうした困難を乗り越えた末に、年間を通じてマアジが風車周辺に集まる傾向があることを明らかにしました。この結果は一見すると好ましいものに思えるかもしれませんが、実際にはそれほど単純ではありません。風車付近に魚が集まっても、その海域で漁業が可能とは限らず、回遊経路の変化によって従来の網漁業の漁場に魚が来なくなるといった懸念もあります。

このように、私たちは今、海洋環境の保全と開発のバランスという極めて難しい課題に直面しています。そしてこの課題に向き合うためには、研究者だけでなく、社会全体、私たち一人ひとりの関心と行動が求められているのです。今後はマアジにとどまらず、より多くの魚種を対象とした網羅的な調査を進めていく予定です。私たちの航海は、まだまだ続きます。

写真3 長崎大学水産学部の附属練習船“鶴洋丸”の調査航海での1コマ。

<本論文のタイトルと著者>

タイトル : Floating offshore wind farms attract Japanese horse mackerel
(浮体式洋上風力発電施設はマアジを引き寄せる)

著 者 : Shimpei Tsuchida, Riko Kato, Shoko Nishitsuji, Sayano Anzai, Siti Syazwani Azmi,
Shogo Tanaka, Satoshi Masumi, Jun Uchida, Takashi Aoshima, Katsuya Hirasaka,
Shingo Fujimoto, Kenichi Shimizu, Miyuki Hirose, Mitsuharu Yagi
(土田真平・加藤理子・西辻祥子・安齋沙矢乃・シティシャズワニアズミ・田中章吾・眞角
聡・内田淳・青島隆・平坂勝也・藤本真悟・清水健一・広瀬美由紀・八木光晴)

掲 載 誌 : Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems

DOI : <http://dx.doi.org/10.1002/aqc.70189>

<参考文献>

[1] Mitsuharu Yagi, Tsunefumi Kobayashi, Yutaka Maruyama, Sota Hoshina, Satoshi Masumi, Itaru Aizawa, Jun Uchida, Tsukasa Kinoshita, Nobuhiro Yamawaki, Takashi Aoshima, Yasuhiro Morii, Kenichi Shimizu, 2022. Microplastic pollution of commercial fishes from coastal and offshore waters in southwestern Japan, Marine Pollution Bulletin, 113304.

<https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.113304>

[2] Tsunefumi Kobayashi, Mitsuharu Yagi, Toshiya Kawaguchi, Toshiro Hata, Kenichi Shimizu, 2021, Spatiotemporal variations of surface water microplastics near Kyushu, Japan: A quali-quantitative analysis, Marine Pollution Bulletin, 112563.

<https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112563>

【本リリースに関するお問い合わせ先】

長崎大学総合生産科学域/大学院水産・環境科学総合研究科/水産学部 准教授 八木 光晴

E-mail: yagi-m@nagasaki-u.ac.jp

ホームページ : <https://sites.google.com/view/yagi-lab/>